


**USAGE DE PRODUITS DU TABAC AROMATISÉS
CHEZ LES ÉLÈVES CANADIENS :
DONNÉES DE L'ENQUÊTE SUR LE TABAGISME
CHEZ LES JEUNES 2010-2011**

Date: 7 octobre, 2013



PROPEL
CENTRE POUR
L'AVANCEMENT
DE LA SANTÉ
DES POPULATIONS

Référence suggérée

Manske SR, Rynard V, Minaker L. Usage de produits du tabac aromatisés chez les élèves canadiens : *Données de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (2010-2011)*, Université de Waterloo, Propel Centre pour l'avancement de la santé des populations, 1-17, octobre, 2013.

www.yss.uwaterloo.ca/index.cfm?section=5&page=288

L'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) est le fruit du projet pancanadien de renforcement des capacités financé grâce à un accord de contribution entre Santé Canada et le *Propel Centre pour l'avancement de la santé des populations* pour la période 2004–2007 et à un contrat signé entre Santé Canada et le *Propel Centre pour l'avancement de la santé des populations* pour la période 2008–2011. Le consortium ETJ comprend des chercheurs canadiens de toutes les provinces dont les travaux portent sur le tabagisme, et offre des opportunités de formation à des étudiants universitaires de tous les niveaux. Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement la position de Santé Canada.

Pour de plus amples renseignements concernant ce projet, prière de communiquer avec :

Steve Manske
Scientifique principal
Centre pour l'avancement de la santé des populations Propel
Lyle S. Hallman Institute
Université de Waterloo
200, avenue University, Ouest
Waterloo, ON N2L 3G1
519-888-4518
manske@uwaterloo.ca
www.yss.uwaterloo.ca

CONTEXTE

L'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) est une étude biennale réalisée en classe à partir d'un échantillon représentatif d'écoles dans les dix provinces canadiennes. Le cycle 2010-2011 de l'ETJ ne comprenait pas la province du Nouveau-Brunswick¹. Entre octobre 2010 et juin 2011², 426 écoles et 50 949 élèves ont participé à l'ETJ. Le tableau 1 indique le nombre de participants par province. Une pondération est appliquée aux données afin d'obtenir des estimations populationnelles. Cette pondération permet de s'assurer que les résultats sont représentatifs de l'ensemble de la population à l'étude et de les ajuster en fonction de la méthode d'échantillonnage et du taux de réponse. Dans les tableaux, les données qui ne reflètent pas des estimations fiables ont été supprimées.

Tableau 1 : Élèves ayant participé à l'étude, par province, ETJ 2010-2011

| Province | Élèves participants | Taux de réponse (%) |
|---------------|---------------------|---------------------|
| NL | 5010 | 86 |
| PE | 2830 | 77 |
| NS | 6240 | 65 |
| QC | 4266 | 89 |
| ON | 9817 | 56 |
| MB | 7471 | 82 |
| SK | 3284 | 71 |
| AB | 4500 | 62 |
| BC | 7531 | 80 |
| Canada | 50949 | 73 |

Le principal objectif de l'ETJ est de fournir des données de références sur la prévalence du tabagisme, à l'échelle provinciale et nationale, parmi les élèves de la 6^e à la 12^e année (6^e année du primaire à la 5^e année du secondaire au Québec). Le questionnaire de l'ETJ 2010-2011 (le cycle le plus récent dont les données sont actuellement disponibles) comportait des questions sur l'usage de produits du tabac par les élèves, incluant les produits aromatisés. Il est possible de consulter le guide de l'utilisateur en ligne pour obtenir plus de détails sur la réalisation de l'ETJ (www.yss.uwaterloo.ca/results/yss10_user_guide_fr.pdf).

Les questions portant sur l'usage du tabac au cours des 30 derniers jours présentent un intérêt particulier pour ce rapport. Le tableau 2 présente les libellés des questions dont les réponses ont été analysées et sont présentées dans les tableaux suivants.

¹ La province du Nouveau-Brunswick a choisi de ne pas participer à l'ETJ 2010-2011. Selon l'analyse comparative menée en utilisant les données de l'enquête de 2008-2009, l'absence du Nouveau-Brunswick ne modifie pas significativement les estimations nationales de prévalence d'usage de produits du tabac.

² La majorité des données ont été recueillies entre janvier et mai 2011.

Tableau 2 : Libellés des questions et des choix de réponses sur l'usage des produits du tabac au cours des 30 derniers jours, ETJ 2010-2011

| Questions | Choix de Réponses |
|--|---|
| Au cours des 30 derniers jours, combien de jours as-tu fumé au moins une cigarette? | <ul style="list-style-type: none"> • Aucun • 1 jour • De 2 à 3 jours • De 4 à 5 jours • De 6 à 10 jours • De 11 à 20 jours • De 21 à 29 jours • 30 jours (<i>tous les jours</i>) |
| Au cours des 30 derniers jours, as-tu utilisé l'un des produits suivants? (Coche toutes les réponses qui s'appliquent) | <ul style="list-style-type: none"> • Du tabac à pipe • Des cigarillos ou des petits cigares (réguliers ou avec saveurs) • Des cigares (en excluant les cigarillos ou les petits cigares, réguliers ou avec saveurs) • Des cigarettes que tu roules toi-même (seulement du tabac) • Des bidis (de petites cigarettes qui ont été roulées à la main dans des feuilles, attachées avec un fil aux extrémités, et offertes avec différentes saveurs) • Du tabac sans fumée (tabac à chiquer, à priser ou à priser dans la bouche) • Des timbres à la nicotine, gomme à mâcher à la nicotine, pastilles à la nicotine ou inhalateurs à la nicotine • Une pipe à eau pour fumer du tabac (connue sous d'autres noms, tels que houka, shisha, narg-eelay ou gouza) • Des feuilles d'enveloppe (un papier ou un tube fait de tabac, utilisé pour rouler du tabac de cigarettes) • Je n'ai consommé aucun de ces produits au cours des 30 derniers jours |
| Au cours des 30 derniers jours, as-tu consommé l'un des produits du tabac aromatisés suivants? (Coche toutes les réponses qui s'appliquent) | <ul style="list-style-type: none"> • Cigarette au menthol • Cigarillo ou petit cigare aromatisé • Cigare aromatisé • Bidi aromatisée • Tabac sans fumée aromatisé • Tabac aromatisé dans une pipe à eau • Je n'ai consommé aucun de ces produits au cours des 30 derniers jours |

RÉSULTATS

Le tableau 3 présente la proportion d'élèves qui ont fait usage des produits du tabac au cours des 30 derniers jours au Canada et dans chaque province, par année scolaire et par sexe. Le tableau 4 présente les estimations populationnelles correspondant à chacune des proportions incluses dans le tableau 3. Les tableaux 5 et 6 montrent la proportion d'utilisateurs de six différents produits du tabac aromatisés parmi l'ensemble des usagers du produit en question, de même que les estimations populationnelles associées.

La proportion d'élèves fumeurs qui consomment des produits aromatisés nous intéresse particulièrement. Au Canada, 52 % des élèves ayant consommé des produits du tabac au cours des 30 derniers jours avaient utilisé des produits du tabac aromatisés au cours de cette période (52 % des garçons et 51 % des filles). Environ un tiers (32 %) des jeunes Canadiens qui ont fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours ont affirmé avoir fumé des cigarettes mentholées au cours de cette période

(tableau 5). Comme le montre le tableau 3, l'utilisation des produits aromatisés varie d'une province à l'autre.

La proportion d'élèves qui ont affirmé avoir utilisé un produit du tabac (aromatisé ou non) au cours des 30 derniers jours (20 %) est beaucoup plus élevée que la proportion d'élèves qui ont affirmé avoir fumé des cigarettes (14 %) au cours des 30 derniers jours. La proportion d'élèves ayant fait usage d'un produit du tabac aromatisé au cours des 30 derniers jours (10 %) représente plus des deux tiers (71 %) de la proportion d'élèves ayant fumé la cigarette (14 %).

Tableau 3 : Proportion d'élèves qui ont fait usage des produits du tabac au cours des 30 derniers jours, par année scolaire, sexe et région, ETJ 2010-2011

| | Consommation de cigarettes – 30 derniers jours† % [95% CI]^ | Utilisation d'un produit du tabac – 30 derniers jours‡ % [95% CI] | Utilisation d'un produit du tabac aromatisé, 30 derniers jours§ % [95% CI] | % d'élèves qui ont fait usage de tabac aromatisé au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont consommé au cours des 30 derniers jours [95% CI]s |
|---|---|---|--|--|
| Canada*, 9 ^e à 12 ^e année** | 14 [13-16] | 20 [18-22] | 10 [9-12] | 52 [48-55] |
| Canada, Garçons, 9 ^e à 12 ^e année** | 16 [14-18] | 24 [22-25] | 12 [10-14] | 52 [46-58] |
| Canada, Filles, 9 ^e à 12 ^e année** | 13 [11-15] | 16 [14-18] | 8 [7-9] | 51 [48-55] |
| Canada, 9 ^e année ^{††} , sexes confondus | 10 [8-11] | 13 [11-15] | 7 [5-8] | 51 [46-57] |
| Canada, 10 ^e année ^{††} , sexes confondus | 12 [11-14] | 17 [16-19] | 9 [7-10] | 51 [45-57] |
| Canada, 11 ^e année ^{††} , sexes confondus | 16 [13-18] | 22 [19-24] | 12 [10-14] | 56 [52-60] |
| Canada, 12 ^e année ^{††} , sexes confondus | 21 [18-23] | 28 [26-31] | 14 [11-17] | 49 [42-55] |
| Atlantique*, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 20 [18-22] | 25 [23-26] | 12 [11-13] | 49 [46-51] |
| Atlantique, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 23 [20-25] | 29 [27-32] | 15 [14-17] | 52 [49-56] |
| Atlantique, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 17 [16-19] | 20 [18-21] | 9 [8-10] | 43 [39-47] |
| Québec, Sec III-V sexes confondus | 15 [12-18] | 21 [17-24] | 12 [9-15] | 59 [50-68] |
| Québec, Sec III-V garçons | 16 [12-19] | 22 [17-27] | 13¶ [7-18] | 59 [43-74] |
| Québec, Sec III-V filles | 14 [10-18] | 19 [15-24] | 12 [9-15] | 60 [53-68] |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 11 [8-14] | 16 [14-19] | 8 [5-10] | 46 [39-54] |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 13 [11-16] | 21 [19-23] | 10 [8-13] | 49 [38-61] |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 9¶ [5-12] | 11 [8-14] | 4¶ [3-6] | 40 [33-47] |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 13 [10-16] | 18 [13-22] | 9¶ [6-12] | 49 [44-55] |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 16 [11-20] | 22 [16-29] | 11¶ [7-16] | 51 [44-58] |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 11 [9-12] | 13 [10-16] | 6 [4-8] | 47 [42-51] |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 28¶ [14-42] | 34¶ [20-47] | 18 [14-23] | 54 [43-65] |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 32¶ [21-43] | 42 [32-52] | 25 [21-29] | 60 [50-69] |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, filles | # | # | 11¶ [5-18] | 44 [34-54] |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 18 [13-22] | 23 [19-28] | 13 [10-16] | 56 [52-60] |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 17¶ [12-23] | 25 [20-31] | 12¶ [8-17] | 49 [40-57] |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 18 [14-22] | 21 [17-26] | 14 [11-17] | 65 [56-74] |

| | Consommation de cigarettes – 30 derniers jours† % [95% CI]^ | Utilisation d'un produit du tabac – 30 derniers jours‡ % [95% CI] | Utilisation d'un produit du tabac aromatisé, 30 derniers jours§ % [95% CI] | % d'élèves qui ont fait usage de tabac aromatisé au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont consommé au cours des 30 derniers jours [95% CI]s |
|---|---|---|--|--|
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 17 [15-19] | 23 [20-26] | 12 [10-15] | 53 [46-59] |
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 17 [15-19] | 25 [23-28] | 13 [11-15] | 52 [48-56] |
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 17 [14-20] | 20 [17-23] | 11 [8-14] | 54 [43-66] |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus ^{**} | 10 [9-11] | 13 [12-14] | 7 [6-7] | 50 [47-54] |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, garçons ^{**} | 11 [10-12] | 16 [15-17] | 8 [7-9] | 50 [46-55] |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, filles ^{**} | 9 [8-10] | 11 [10-12] | 5 [5-6] | 50 [46-54] |
| Canada, 6 ^e année, sexes confondus | 1¶ [1-1] | 1¶ [1-2] | 1¶ [0-1] | 35¶ [20-51] |
| Canada, 7 ^e année ^{§§} , sexes confondus | 2 [1-3] | 3 [2-4] | 1¶ [1-1] | 36 [27-45] |
| Canada, 8 ^e année ^{§§} , sexes confondus | 6 [4-8] | 8 [6-9] | 3 [2-4] | 42 [34-49] |
| Atlantique, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 14 [13-15] | 17 [16-18] | 8 [7-9] | 47 [44-49] |
| Québec, 6 ^e année à Sec V, sexes confondus | 10 [8-12] | 14 [11-16] | 8 [6-9] | 55 [49-62] |
| Ontario, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 7 [5-9] | 11 [9-12] | 5 [4-6] | 45 [38-53] |
| Manitoba, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 10 [8-12] | 13 [10-16] | 6 [4-8] | 45 [40-50] |
| Saskatchewan, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 18¶ [10-27] | 23¶ [14-31] | 12 [9-15] | 53 [43-63] |
| Alberta, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 12 [9-14] | 15 [13-18] | 8 [7-10] | 55 [52-58] |
| Colombie-Britannique, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 12 [10-14] | 16 [15-18] | 8 [7-10] | 52 [43-60] |

^ Intervalles de confiance à 95 % indiqués entre parenthèses.

* Le Nouveau-Brunswick a choisi de ne pas participer à l'ETJ 2010-2011.

† Inclut la consommation quotidienne, occasionnelle et l'expérimentation.

‡ « Un produit du tabac » peut être une cigarette, du tabac à pipe, un cigarillo ou petit cigare, un cigare, une cigarette roulée, une bidi, du tabac sans fumée, du tabac fumé dans une pipe à eau, ou une feuille d'enveloppe, mais n'inclut pas l'utilisation de timbres de nicotine, de gommes de nicotine, de pastilles ou d'inhalateur de nicotine.

§ « Un produit du tabac aromatisé » peut être une cigarette mentholée, un cigarillo ou petit cigare aromatisé, un cigare aromatisé, une bidi aromatisée, du tabac sans fumée aromatisé et du tabac aromatisé fumé dans une pipe à eau. Les données brutes incluaient un faible nombre d'élèves qui affirmaient avoir utilisé des produits du tabac aromatisé au cours des 30 derniers jours, mais qui n'avaient pas rapporté avoir utilisé ces produits dans des questions antérieures. Ces cas ont été exclus des estimations.

¶ Variabilité échantillonnale modérée : interpréter avec prudence.

Variabilité échantillonnale élevée : estimation imprécise.

| | Consommation de cigarettes – 30 derniers jours† % [95% CI]^ | Utilisation d'un produit du tabac – 30 derniers jours‡ % [95% CI] | Utilisation d'un produit du tabac aromatisé, 30 derniers jours§ % [95% CI] | % d'élèves qui ont fait usage de tabac aromatisé au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont consommé au cours des 30 derniers jours [95% CI]s |
|--|--|--|---|---|
|--|--|--|---|---|

** Secondaire III–V au Québec.

†† Au Québec, la 9^e année correspond à la 3^e année du secondaire, la 10^e année à la 4^e année du secondaire, la 11^e année à la 5^e année du secondaire et la 12^e année n'existe pas; elle correspond à la première année du Cégep.

‡‡ 6^e année–5^e secondaire au Québec.

§§ Au Québec, la 7^e année correspond à la 1^{re} année du secondaire, et la 8^e année à la 2^e année du secondaire.

Source: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2010-11

Table 4: Estimations populationnelles du nombre d'élèves ayant utilisé des produits du tabac au cours des 30 derniers jours, par année scolaire, sexe et région, ETJ 2010-2011

| | Consommation de cigarettes – 30 derniers jours† Estimations populationnelles | Utilisation d'un produit du tabac – 30 derniers jours‡ Estimations populationnelles | Utilisation d'un produit du tabac aromatisé, 30 derniers jours§ Estimations populationnelles |
|---|---|--|---|
| Canada*, 9 ^e à 12 ^e année** | 237,100 | 327,000 | 169,300 |
| Canada, Garçons, 9 ^e à 12 ^e année ** | 134,800 | 199,700 | 103,800 |
| Canada, Filles, 9 ^e à 12 ^e année ** | 102,300 | 127,300 | 65,500 |
| Canada, 9 ^e année ††, sexes confondus | 40,100 | 52,400 | 26,900 |
| Canada, 10 ^e année ††, sexes confondus | 51,800 | 73,500 | 37,700 |
| Canada, 11 ^e année ††, sexes confondus | 65,300 | 90,800 | 51,000 |
| Canada, 12 ^e année ††, sexes confondus | 79,900 | 110,300 | 53,800 |
| Atlantique*, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 16,000 | 19,800 | 9,600 |
| Atlantique, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 9,200 | 12,000 | 6,300 |
| Atlantique, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 6,900 | 7,800 | 3,400 |
| Québec, Sec III-V sexes confondus | 40,300 | 56,300 | 33,400 |
| Québec, Sec III-V garçons | 21,700 | 30,400 | 17,800¶ |
| Québec, Sec III-V filles | 18,600 | 25,900 | 15,600 |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 79,300 | 117,000 | 54,200 |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 49,800 | 79,100 | 39,100 |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 29,500¶ | 37,900 | 15,100¶ |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 8,700 | 11,700 | 5,800¶ |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 5,300 | 7,500 | 3,800¶ |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 3,500 | 4,200 | 2,000 |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 15,400¶ | 18,700¶ | 10,100 |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 9,100¶ | 11,800 | 7,100 |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, filles | # | # | 3,000¶ |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 34,900 | 46,000 | 25,700 |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 17,100¶ | 25,100 | 12,200¶ |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 17,800 | 20,900 | 13,500 |
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 42,400 | 57,500 | 30,500 |
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, | 22,700 | 33,700 | 17,500 |

| | Consommation de cigarettes – 30 derniers jours† Estimations populationnelles | Utilisation d'un produit du tabac – 30 derniers jours‡ Estimations populationnelles | Utilisation d'un produit du tabac aromatisé, 30 derniers jours§ Estimations populationnelles |
|--|---|---|--|
| garçons | | | |
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 19,700 | 23,800 | 13,000 |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus ^{††} | 272,400 | 374,400 | 188,000 |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, garçons ^{††} | 152,900 | 226,200 | 114,200 |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, filles ^{††} | 119,500 | 148,200 | 73,800 |
| Canada, 6 ^e année, sexes confondus | 2,900¶ | 5,300¶ | 1,900¶ |
| Canada, 7 ^e année ^{§§} sexes confondus | 8,100 | 11,600 | 4,200¶ |
| Canada, 8 ^e année ^{§§} sexes confondus | 24,300 | 30,600 | 12,700 |
| Atlantique, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 18,300 | 22,700 | 10,600 |
| Québec, 6 ^e année à Sec V, sexes confondus | 55,900 | 75,600 | 41,800 |
| Ontario, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 84,900 | 126,500 | 57,300 |
| Manitoba, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 10,500 | 14,100 | 6,400 |
| Saskatchewan, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 16,600¶ | 20,300¶ | 10,800 |
| Alberta, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 38,100 | 50,800 | 28,000 |
| Colombie-Britannique, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 48,100 | 64,400 | 33,200 |

* Le Nouveau-Brunswick a choisi de ne pas participer à l'ETJ 2010-2011.

† Inclut la consommation quotidienne, occasionnelle et l'expérimentation.

‡ « Un produit du tabac » peut être une cigarette, du tabac à pipe, un cigarillo ou petit cigare, un cigare, une cigarette roulée, une bidi, du tabac sans fumée, du tabac fumé dans une pipe à eau, ou une feuille d'enveloppe, mais n'inclut pas l'utilisation de timbres de nicotine, de gommes de nicotine, de pastilles ou d'inhalateur de nicotine.

§ « Un produit du tabac aromatisé » peut être une cigarette mentholée, un cigarillo ou petit cigare aromatisé, un cigare aromatisé, une bidi aromatisée, du tabac sans fumée aromatisé et du tabac aromatisé fumé dans une pipe à eau. Les données brutes incluaient un faible nombre d'élèves qui affirmaient avoir utilisé des produits du tabac aromatisé au cours des 30 derniers jours, mais qui n'avaient pas rapporté avoir utilisé ces produits dans des questions antérieures. Ces cas ont été exclus des estimations.

¶ Variabilité échantillonnale modérée : interpréter avec prudence.

Variabilité échantillonnale élevée : estimation imprécise.

** Secondaire III–V au Québec.

†† Au Québec, la 9^e année correspond à la 3^e année du secondaire, la 10^e année à la 4^e année du secondaire, la 11^e année à la 5^e année du secondaire et la 12^e année n'existe pas; elle correspond à la première année du Cégep.

‡‡ 6^e année–5^e secondaire au Québec.

§§ Au Québec, la 7^e année correspond à la 1^{re} année du secondaire, et la 8^e année à la 2^e année du secondaire.

Les résultats peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison d'arrondissement

Source: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2010-11

Table 5: Proportion d'élèves qui ont fait usage de produits du tabac aromatisés au cours des 30 derniers jours, par année scolaire, sexe et région, ETJ 2010-2011

| | % d'élèves qui ont fumé des cigarettes au menthol parmi ceux qui ont fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares aromatisés parmi ceux qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont fumé des cigares aromatisés parmi ceux qui ont fumé des cigares au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont fumé des bidis aromatisées parmi ceux qui ont fumé des bidis au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont consommé du tabac sans fumée aromatisé parmi ceux qui ont consommé du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont consommé du tabac aromatisé dans une pipe à eau parmi ceux qui ont fumé la pipe à eau au cours des 30 derniers jours % [95% CI] |
|---|---|--|--|---|--|---|
| Canada*, 9 ^e à 12 ^e année** | 32 [28-35] | 65 [61-69] | 50 [43-56] | 67 [57-76] | 70 [65-75] | 54 [49-60] |
| Canada, Garçons, 9 ^e à 12 ^e année ** | 32 [26-37] | 64 [59-69] | 46 [38-54] | 56 [44-68] | 69 [63-74] | 46 [39-54] |
| Canada, Filles, 9 ^e à 12 ^e année ** | 32 [28-36] | 68 [63-74] | 61 [51-70] | 88 [78-98] | 75 [62-88] | 69 [57-80] |
| Canada, 9 ^e année ^{††} , sexes confondus | 32 [26-37] | 64 [56-72] | 56 [47-66] | 74 [56-91] | 75 [65-84] | 76 [66-87] |
| Canada, 10 ^e année ^{††} , sexes confondus | 33 [26-40] | 61 [55-68] | 55 [44-65] | 69 [53-86] | 76 [66-87] | 53 [41-65] |
| Canada, 11 ^e année ^{††} , sexes confondus | 34 [29-39] | 61 [55-67] | 52 [42-62] | 82 [71-94] | 76 [65-86] | 63 [55-71] |
| Canada, 12 ^e année ^{††} , sexes confondus | 29 [24-35] | 74 [66-81] | 40 [31-49] | 38¶ [24-52] | 58 [46-71] | 41 [29-52] |
| Atlantique*, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 37 [33-40] | 64 [60-69] | 47 [42-51] | 62 [55-68] | 63 [57-68] | 50 [45-55] |
| Atlantique, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 38 [34-42] | 64 [59-68] | 47 [42-51] | 63 [55-71] | 65 [60-70] | 49 [43-55] |
| Atlantique, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 34 [29-39] | 66 [59-73] | 48 [38-57] | # | # | 53 [42-65] |
| Québec, Sec III-V sexes confondus | 26¶ [15-37] | 60 [53-67] | 54¶ [34-75] | # | # | 78 [65-92] |
| Québec, Sec III-V garçons | # | 60 [50-71] | # | # | # | # |
| Québec, Sec III-V filles | # | 59 [51-67] | # | # | # | # |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 28 [20-36] | 67 [58-76] | 44 [35-53] | # | 72 [62-82] | 40 [32-48] |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 29¶ [18-40] | 67 [57-77] | 42 [30-54] | # | 73 [62-84] | 34¶ [23-45] |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 26¶ [16-36] | 66 [55-78] | # | # | # | 53¶ [34-71] |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 34 [27-40] | 66 [61-72] | 47 [36-58] | # | 70 [58-83] | 44 [36-52] |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 32 [23-41] | 68 [64-73] | 45 [31-58] | # | 70 [55-84] | 43 [30-57] |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 36 [28-44] | 62 [50-74] | # | # | # | # |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 36 [27-45] | 68 [56-79] | 48 [37-58] | # | 63 [46-80] | 70 [60-80] |

| | % d'élèves qui ont fumé des cigarettes au menthol parmi ceux qui ont fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares aromatisés parmi ceux qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont fumé des cigares aromatisés parmi ceux qui ont fumé des cigares au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont fumé des bidis aromatisés parmi ceux qui ont fumé des bidis au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont consommé du tabac sans fumée aromatisé parmi ceux qui ont consommé du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont consommé du tabac aromatisé dans une pipe à eau parmi ceux qui ont fumé la pipe à eau au cours des 30 derniers jours % [95% CI] |
|--|---|--|--|--|--|---|
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 36¶ [23-48] | 68 [56-79] | 49 [39-59] | # | 65 [47-83] | 71 [61-80] |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 36 [29-42] | 67 [53-82] | # | # | # | # |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 37 [28-45] | 68 [61-75] | 69 [54-84] | # | 72 [57-87] | 74 [53-94] |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 25¶ [13-36] | 62 [50-74] | 61 [45-77] | # | 57 [47-67] | # |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 48¶ [32-64] | 75 [68-83] | 81 [61-100] | # | # | # |
| sexes confondus | 36 [32-40] | 67 [55-80] | 37¶ [17-57] | 38¶ [21-55] | 68 [64-71] | 56 [43-69] |
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 35 [31-40] | 60 [54-66] | 31¶ [10-52] | # | 68 [63-72] | 54 [41-68] |
| Colombie-Britannique, Gr. 9 ^e à 12 ^e année, filles | 37 [33-40] | 78 [56-99] | 53 [37-69] | # | # | 59 [45-72] |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus ^{††} | 30 [27-34] | 65 [61-69] | 49 [44-55] | 65 [56-73] | 69 [64-74] | 55 [50-60] |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, garçons ^{††} | 30 [25-35] | 63 [58-68] | 46 [39-53] | 55 [45-65] | 68 [63-74] | 46 [40-53] |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, filles ^{††} | 31 [27-34] | 68 [62-74] | 58 [50-66] | 86 [76-96] | 72 [60-84] | 69 [59-80] |
| Canada, 6 ^e année, sexes confondus | # | # | # | # | # | # |
| Canada, 7 ^e année ^{§§} sexes confondus | 19¶ [11-28] | 61¶ [38-83] | # | # | # | # |
| Canada, 8 ^e année ^{§§} sexes confondus | 22 [15-28] | 61 [50-71] | 43 [31-55] | # | 63 [47-78] | 55 [37-73] |
| Atlantique, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 35 [32-38] | 64 [60-69] | 48 [44-52] | 63 [57-69] | 62 [57-67] | 51 [46-56] |
| Québec, 6 ^e année à Sec V, sexes confondus | 25¶ [16-35] | 61 [55-67] | 50 [36-65] | # | # | 71 [60-81] |
| Ontario, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 28 [20-35] | 65 [56-74] | 43 [34-51] | # | 72 [63-81] | 41 [33-49] |
| Manitoba, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 32 [26-37] | 63 [57-70] | 47 [36-58] | # | 68 [57-80] | 44 [37-52] |
| Saskatchewan, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 34 [26-43] | 68 [57-79] | 49 [39-59] | # | 62 [45-80] | 69 [58-79] |
| Alberta, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 34 [27-42] | 68 [61-75] | 69 [54-83] | # | 73 [59-86] | 75 [56-95] |
| Colombie-Britannique, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 34 [29-39] | 67 [53-80] | 40¶ [22-58] | 46¶ [28-64] | 68 [64-71] | 58 [46-70] |

| % d'élèves qui ont fumé des cigarettes au menthol parmi ceux qui ont fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares aromatisés parmi ceux qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont fumé des cigares aromatisés parmi ceux qui ont fumé des cigares au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont fumé des bidis aromatisées parmi ceux qui ont fumé des bidis au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont consommé du tabac sans fumée aromatisé parmi ceux qui ont consommé du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours % [95% CI] | % d'élèves qui ont consommé du tabac aromatisé dans une pipe à eau parmi ceux qui ont fumé la pipe à eau au cours des 30 derniers jours % [95% CI] |
|---|--|--|---|--|---|
|---|--|--|---|--|---|

^ Intervalles de confiance à 95 % indiqués entre parenthèses.

* Le Nouveau-Brunswick a choisi de ne pas participer à l'ETJ 2010-2011.

† Inclut la consommation quotidienne, occasionnelle et l'expérimentation.

¶ Variabilité échantillonnale modérée : interpréter avec prudence.

Variabilité échantillonnale élevée : estimation imprécise.

** Secondaire III-V au Québec.

†† Au Québec, la 9e année correspond à la 3e année du secondaire, la 10e année à la 4e année du secondaire, la 11e année à la 5e année du secondaire et la 12e année n'existe pas; elle correspond à la première année du Cégep.

‡‡ 6e année-5e secondaire au Québec.

§§ Au Québec, la 7e année correspond à la 1re année du secondaire, et la 8e année à la 2e année du secondaire.

Source: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2010-11

Table 6: Estimations populationnelles du nombre d'élèves ayant utilisé des produits du tabac aromatisés au cours des 30 derniers jours, par année scolaire, sexe et région, ETJ 2010-2011

| Estimations Populationnelles | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | Utilisation d'un produit du tabac aromatisé, 30 derniers jours§ | Élèves ayant fumé la cigarette au menthol au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui on fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des cigarillos ou petits cigares aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des cigares aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des cigares au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des bidis aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des bidis au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant consommé du tabac sans fumée aromatisé au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont consommé du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé la pipe à eau aromatisée au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé la pipe à eau |
| Canada*, 9 ^e à 12 ^e année** | 169,300 | 75,200 | 84,100 | 41,000 | 10,000 | 28,200 | 34,300 |
| Canada, Garçons, 9 ^e à 12 ^e année ** | 103,800 | 42,500 | 53,500 | 28,300 | 5,700 | 22,700 | 18,700 |
| Canada, Filles, 9 ^e à 12 ^e année ** | 65,500 | 32,700 | 30,600 | 12,800 | 4,300 | 5,500 | 15,500 |
| Canada, Gr. 9 ⁺⁺ , sexes confondus | 26,900 | 12,700 | 14,000 | 8,700 | 3,000 | 4,900 | 6,600 |
| Canada, Gr. 10 ⁺⁺ , sexes confondus | 37,700 | 17,100 | 17,300 | 9,800 | 1,600 | 6,200 | 6,400 |
| Canada, Gr. 11 ⁺⁺ , sexes confondus | 51,000 | 22,100 | 24,500 | 13,000 | 4,000 | 9,300 | 11,600 |
| Canada, Gr. 12 ⁺⁺ , sexes confondus | 53,800 | 23,300 | 28,300 | 9,500 | 1,500¶ | 7,800 | 9,700 |
| Atlantique*, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 9,600 | 5,900 | 4,600 | 2,400 | 700 | 1,400 | 1,300 |
| Atlantique, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 6,300 | 3,500 | 3,300 | 1,900 | 600 | 1,200 | 1,000 |
| Atlantique, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 3,400 | 2,400 | 1,300 | 500 | # | # | 300 |
| Québec, Sec III-V sexes confondus | 33,400 | 10,500¶ | 17,800 | 9,600¶ | # | # | 8,100 |
| Québec, Sec III-V garçons | 17,800¶ | # | 10,500 | # | # | # | # |
| Québec, Sec III-V filles | 15,600 | # | 7,200 | # | # | # | # |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 54,200 | 22,400 | 24,700 | 10,700 | # | 11,500 | 11,300 |

| Estimations Populationnelles | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| | Utilisation d'un produit du tabac aromatisé, 30 derniers jours§ | Élèves ayant fumé la cigarette au menthol au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui on fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des cigarillos ou petits cigares aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des cigares aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des cigares au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des bidis aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des bidis au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant consommé du tabac sans fumée aromatisé au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont consommé du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé la pipe à eau aromatisée au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé la pipe à eau |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 39,100 | 14,600¶ | 19,100 | 8,600 | # | 10,600 | 6,500¶ |
| Ontario, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 15,100¶ | 7,700¶ | 5,600 | # | # | # | 4,800¶ |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 5,800¶ | 2,900 | 2,900 | 1,800 | # | 1,000 | 800 |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 3,800¶ | 1,700 | 2,100 | 1,500 | # | 900 | 600 |
| Manitoba, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 2,000 | 1,200 | 800 | # | # | # | # |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 10,100 | 5,500 | 4,400 | 2,200 | # | 2,300 | 1,100 |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 7,100 | 3,300¶ | 3,300 | 1,800 | # | 2,100 | 900 |
| Saskatchewan, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 3,000¶ | 2,300 | 1,100 | # | # | # | # |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 25,700 | 12,800 | 16,100 | 9,900 | # | 5,400 | 5,600 |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 12,200¶ | 4,300¶ | 8,200 | 5,200 | # | 2,300 | # |
| Alberta, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 13,500 | 8,500¶ | 7,900 | 4,700 | # | # | # |
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 30,500 | 15,300 | 13,700 | 4,500¶ | 1,000¶ | 5,700 | 6,000 |
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, garçons | 17,500 | 8,000 | 7,100 | 2,800¶ | # | 5,000 | 4,100 |

| Estimations Populationnelles | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| | Utilisation d'un produit du tabac aromatisé, 30 derniers jours§ | Élèves ayant fumé la cigarette au menthol au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui on fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des cigarillos ou petits cigares aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des cigares aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des cigares au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des bidis aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des bidis au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant consommé du tabac sans fumée aromatisé au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont consommé du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé la pipe à eau aromatisée au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé la pipe à eau |
| Colombie-Britannique, 9 ^e à 12 ^e année, filles | 13,000 | 7,300 | 6,600 | 1,700 | # | # | 2,000 |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus ^{††} | 188,000 | 82,700 | 91,800 | 46,600 | 11,700 | 31,100 | 38,100 |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, garçons ^{††} | 114,200 | 45,900 | 57,400 | 31,600 | 6,900 | 25,000 | 20,900 |
| Canada, 6 ^e à 12 ^e année, filles ^{††} | 73,800 | 36,800 | 34,400 | 15,000 | 4,800 | 6,100 | 17,200 |
| Canada, 6 ^e année, sexes confondus | 1,900¶ | # | # | # | # | # | # |
| Canada, 7 ^e année ^{§§} sexes confondus | 4,200¶ | 1,600¶ | 1,200¶ | # | # | # | # |
| Canada, 8 ^e année ^{§§} sexes confondus | 12,700 | 5,300 | 6,100 | 3,200 | # | 2,200 | 2,500 |
| Atlantique, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 10,600 | 6,400 | 5,000 | 2,700 | 900 | 1,600 | 1,500 |
| Québec, 6 ^e année à Sec V, sexes confondus | 41,800 | 14,100¶ | 22,200 | 12,100 | # | # | 9,100 |
| Ontario, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 57,300 | 23,600 | 25,500 | 11,600 | # | 12,500 | 12,300 |
| Manitoba, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 6,400 | 3,300 | 3,000 | 1,900 | # | 1,000 | 800 |
| Saskatchewan, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 10,800 | 5,700 | 4,700 | 2,300 | # | 2,400 | 1,100 |
| Alberta, 6 ^e à 12 ^e année, sexes confondus | 28,000 | 13,100 | 16,600 | 10,600 | # | 6,000 | 6,300 |
| Colombie-Britannique, 6 ^e à 12 ^e année, | 33,200 | 16,400 | 14,700 | 5,300¶ | 1,500¶ | 6,100 | 6,900 |

Estimations Populationnelles

| Utilisation d'un produit du tabac aromatisé, 30 derniers jours§ | Élèves ayant fumé la cigarette au menthol au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui on fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des cigarillos ou petits cigares aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des cigarillos ou petits cigares au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des cigares aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des cigares au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé des bidis aromatisés au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé des bidis au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant consommé du tabac sans fumée aromatisé au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont consommé du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours | Élèves ayant fumé la pipe à eau aromatisée au cours des 30 derniers jours parmi ceux qui ont fumé la pipe à eau |
|---|---|--|--|--|---|---|
|---|---|--|--|--|---|---|

sexes confondus

* Le Nouveau-Brunswick a choisi de ne pas participer à l'ETJ 2010-2011.

† Inclut la consommation quotidienne, occasionnelle et l'expérimentation.

¶ Variabilité échantillonnale modérée : interpréter avec prudence.

Variabilité échantillonnale élevée : estimation imprécise.

** Secondaire III-V au Québec.

†† Au Québec, la 9e année correspond à la 3e année du secondaire, la 10e année à la 4e année du secondaire, la 11e année à la 5e année du secondaire et la 12e année n'existe pas; elle correspond à la première année du Cégep.

‡‡ 6e année-5e secondaire au Québec.

§§ Au Québec, la 7e année correspond à la 1re année du secondaire, et la 8e année à la 2e année du secondaire.

Les résultats peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison d'arrondissement

Source: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2010-11