

Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

819 rue Roy Est, Montréal, QC H2L 1E4; tél.: (514) 598-5533; télécopieur : (514) 598-5283; coalition@cqct.qc.ca

Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE VENDREDI 28 JUIN 2002
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le Québec a le troisième plus bas taux de tabagisme au Canada! La plus récente baisse démontre l'efficacité des mesures de contrôle du tabac – mesures contre lesquelles l'industrie du tabac ne cesse de s'opposer

Montréal, le 28 juin 2002 – Une autre excellente nouvelle pour la santé des Québécois est annoncée aujourd'hui avec le dévoilement des plus récentes statistiques de Santé Canada concernant l'usage du tabac. L'enquête de surveillance du tabagisme pour l'année 2001 montre qu'au Québec, le taux continue de baisser, atteignant **24,1 %**, soit le troisième taux le plus bas au Canada. Cette réduction s'insère dans une tendance à plus long terme, débutant au milieu des années 90, alors que le Québec était la province avec le plus haut taux de tabagisme parmi toutes les provinces.

« Cette excellente nouvelle démontre l'efficacité des différentes mesures législatives et fiscales adoptées par les gouvernements fédéral et du Québec au cours des dernières années, » affirme **Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac**. « Les hausses des taxes, les interdictions de fumer dans les milieux de travail, la diminution de la publicité et les nouveaux avertissements sur les paquets de cigarettes, toutes ces mesures contribuent à rendre le tabac moins attrayant et moins accessible, et informe davantage le public sur les effets néfastes du tabagisme. Ce n'est pas par coïncidence que l'industrie du tabac s'est vigoureusement opposée à toutes et chacune de ces mesures. »

Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac regroupe plus de 740 organisations québécoises—hôpitaux, municipalités, commissions scolaires, groupes communautaires, centres de jeunes et organismes de santé—qui réclament une série de mesures législatives sur le tabac. Depuis sept ans, la Coalition et ses membres travaillent pour appuyer des mesures législatives et fiscales visant à prévenir le tabagisme chez les jeunes, protéger le public contre la fumée secondaire, contrôler la mise en marché du tabac et favoriser l'arrêt tabagique chez les fumeurs.

Mario Bujold, directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé, ajoute qu'« il est clair que nous sommes sur la bonne voie. Il y a eu un changement remarquable dans le comportement et l'attitude des Québécois à l'égard du tabac. Mais il reste encore beaucoup à faire. Le Québec est la province qui a le taux de tabagisme le plus élevé auprès des jeunes (soit de 28,6% chez les de 15 à 19 ans, comparativement à 22,5% pour le Canada). Nous devons donc multiplier nos efforts pour faire adopter des mesures qui contrôleront davantage le comportement de l'industrie, et qui changeront l'environnement et les normes sociales en matière de tabac. »

La Coalition demande, par exemple, que le gouvernement interdise les appellations trompeuses comme "douces" et "légères" qui induisent en erreur des centaines de milliers de fumeurs. Elle aimerait aussi voir disparaître la promotion indirecte des cigarettes, comme les murs promotionnels dans les points de ventes qui envoient des messages contradictoires face à la nature unique et dangereuse du tabac. Ce type de publicité prend de plus en plus d'ampleur compte tenu des interdictions de la promotion traditionnelle. De plus, les groupes de santé continueront à prôner l'efficacité des campagnes d'information similaires à celles de la Floride et de la Californie, qui dénoncent les pratiques manipulatoires et malhonnêtes de l'industrie du tabac, détournant ainsi la rébellion naturelle des adolescents envers les autorités traditionnelles (qui contribue à l'adoption du tabagisme) vers les compagnies de tabac. Enfin, le gouvernement

du Québec doit continuer à progressivement augmenter les taxes provinciales sur le tabac pour réduire le tabagisme chez les jeunes, soit en rattrapant le prix dans les autres provinces. L'écart entre le prix des cigarettes au Québec et la moyenne des prix en vigueur dans les autres provinces (exception faite de l'Ontario) demeure à un niveau inacceptable de 11,89 \$.

« Nous félicitons le gouvernement du Québec d'avoir résisté aux pressions de l'industrie du tabac et d'avoir adopté des mesures de contrôle sur le tabac efficaces, ce qui a propulsé le Québec de la dixième jusqu'à la troisième place quant au taux de tabagisme au pays, » conclut **monsieur Gauvin**. La Coalition reconnaît également l'appui et la participation de ses membres, particulièrement ses membres les plus actifs, dont l'Association pour les droits des non-fumeurs (bureau du Québec), le Conseil québécois sur le tabac et la santé, la Société canadienne du cancer (division du Québec), l'Association pour la santé publique du Québec, l'Association pulmonaire du Québec, l'Alliance pour la lutte au tabagisme - Région de Québec et Chaudière-Appalaches, le Collège québécois des médecins de famille et la Fédération québécoise du Sport étudiant.

– 30 –

Contacteur : ■ **Louis Gauvin**, Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (après 2h00 pm) : pagette : (514) 361-7046 ;
 ■ **Mario Bujold**, directeur général, Conseil québécois sur le tabac et la santé : (514) 948-5317 poste 22, cell. (514) 830-8343
Statistiques disponibles à : ■ <http://www.statcan.ca/Daily/Francais/020628/q020628i.htm> ou
 ■ <http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/tabac/recherches/esutc/index.html>
Pour les tableaux détaillés : ■ contactez Anne Zaborski, Senior Survey Methodologist, Office of Research, Surveillance & Evaluation, Tobacco Control Programme, Health Canada, téléphone: (613) 954-0152 ou ■ la Coalition : (514) 598-5533

ANNEXE 1 : Mesures qui auraient influencé le taux de tabagisme au Québec

- | | |
|----------------------------------|--|
| ■ 1991 à 1993: | Vente de cigarettes de contrebande à bas prix |
| ■ 8 février 1994 : | Baisse substantielle des taxes sur le tabac : le prix d'une cartouche passe de 48 \$ à moins de 23 \$ au Québec |
| ■ 13 février 1998: | Augmentation des taxes sur le tabac de 1.20 \$ la cartouche (0.60 taxe \$ fédérale, 0.60 \$ taxe provinciale) |
| ■ 5 novembre 1999: | Augmentation des taxes sur le tabac de 1.20 \$ la cartouche (0.60 \$ taxe fédérale, 0.60 \$ taxe provinciale) |
| ■ 17 Décembre 1999: | Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les milieux de travail et d'éducation, et des restrictions partielles dans les restaurants et les centres commerciaux |
| ■ 17 juillet 1999: | Entrée en vigueur des sanctions liées aux interdictions de l'usage du tabac |
| ■ 1 ^{er} octobre 2000: | Entrée en vigueur des premières restrictions sur la promotion de la commandite tabac (la seule promotion du tabac de type « style de vie ») : interdiction de tout affichage extérieur (grands babillards extérieurs, pancartes dans les dépanneurs) sauf sur le site d'événements commandités |
| ■ 1 ^{er} octobre 2000: | Inclusion de quatre aides à la cessation dans la liste des médicaments assurés (les patches Nicoderm, Bupropion, Habitrol et la gomme Nicorette) |
| ■ Janvier 2001: | Entrée en vigueur des règlements fédéraux obligeant les nouveaux avertissements recouvrant 50 % de la surface des paquets de cigarettes et comportant des photos ou du graphisme percutants, ainsi que l'impression d'informations supplémentaires concernant, entre autres, l'arrêt tabagique sur la glissière du paquet |
| ■ 5 avril 2001: | Augmentation des taxes sur le tabac de 4.00 \$ la cartouche (2.00 taxe fédérale, 2.00 taxe provinciale) |
| ■ 5 avril 2001: | Augmentation du budget de la lutte contre le tabac de 5 millions \$ à 15 millions \$ |
| ■ Été 2001: | Premier été lors duquel aucun des grands événements n'est commandité par le tabac |
| ■ 17 décembre 2001: | Entrée en vigueur de l'installation obligation de cloisons dans les nouveaux restaurants (ou les restaurants subissant des rénovations majeures) |
| ■ 1 ^{er} novembre 2001: | Augmentation des taxes sur le tabac de 4.50 \$ la cartouche (2.00 \$ taxe fédérale, 2.50 \$ taxe provinciale) |
| ■ 17 juin 2002 : | Augmentation des taxes sur le tabac de 9,09 \$ la cartouche (3.50 \$ taxe fédérale, 5,00 \$ taxe provinciale) |

ANNEXE 2 : Tendances à longs termes

(Extrait du document du Programme de la lutte au tabagisme, Santé Canada, 19 mars 2002)

Long-Term Trends in the Prevalence of Current Smokers

| | 1981 | 1983 | 1985 | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | May 1994 | 94/95 | 96/97 | 98/99 | 1999 | 2000 | 2001 |
|----------|------|-------|------|------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| Atlantic | 40.2 | 37.0 | 37.8 | 33.4 | 32.7 | 30.3 | 32.3 | 31.0 | 33.4 | 31.2 | 29.1 | 27.9 | 28.1 | 24.6 |
| Quebec | 43.7 | 39.8 | 39.6 | 38.1 | 34.9 | 33.9 | 33.1 | 37.7 | 35.4 | 33.2 | 30.4 | 30.3 | 28.2 | 25.7 |
| Ontario | 36.2 | 37.0 | 31.8 | 29.8 | 31.4 | 27.4 | 29.7 | 27.5↑ | 28.2 | 26.1 | 24.7 | 23.2 | 23.0 | 22.0 |
| Prairies | 35.3 | 34.5↓ | 35.3 | 32.7 | 30.7 | 29.7 | 32.0 | 30.2 | 30.0 | 29.2 | 27.9 | 25.3 | 24.3 | 25.7 |
| B.C. | 34.4 | 31.2 | 32.9 | 26.0 | 27.9 | 25.9 | 29.0 | 25.5↓ | 26.7 | 25.0 | 22.4 | 20.0 | 19.6 | 16.5↑ |

Note 1: The symbols ↑ and ↓ refer to the direction of rounding to integers.

Note 2: SOSIC results are calculated from rebased population estimates and exclude missing values.

Note 3: * Moderate sampling variability, interpret with caution. # High sampling variability, data should be suppressed.

Sources: 2001 - Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, Wave 1, February-June 2001; 1999/2000 - Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, Annual Results;

1994/95, 1996/97, 1998/99 - National Population Health Survey (public use files, hence numbers may differ slightly from published Highlight reports); May 1994 - Survey on Smoking in Canada (SOSIC); 1985/91 - General Social Surveys; 1990 - Canada's Health Promotion Survey; 1989 - National Alcohol and Other Drugs Survey; 1981/83/86 - Smoking Behaviour of Canadians (supplements to the Labour Force Surveys): non-proxy

Long-Term Trends in Average Cigarettes/Day by Daily Smokers

| | 1981 | 1983 | 1985 | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | May 1994 | Aug 1994 | Nov 1995 | Feb 94/95 | 96/97 | 98/99 | 1999 | 2000 | 2001 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|------|------|------|
| Atlantic | 20.6 | 20.0 | 21.0 | 20.4 | 20.4 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 18.1 | 17.3 | 18.5 | 17.9 | 17.3 | 17.9 | 17.6 | 17.2 |
| Quebec | 21.3 | 21.1 | 21.7 | 20.8 | 23.3 | 20.4 | 19.7 | 18.1 | 17.6 | 18.4 | 16.8 | 20.1 | 18.9 | 17.6 | 19.1 | 17.6 | 17.1 |
| Ontario | 20.4 | 20.9 | 20.4 | 19.9 | 18.6 | 17.3 | 18.9 | 19.1 | 19.0 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 15.6 |
| Prairies | 20.2 | 20.0 | 19.7 | 19.9 | 18.4 | 17.6 | 18.1 | 19.2 | 20.0 | 19.4 | 19.5 | 17.5 | 16.9 | 16.4 | 16.1 | 16.3 | 15.7 |
| B.C. | 20.1 | 21.4 | 19.3 | 20.4 | 18.9 | 17.8 | 17.1 | 18.7 | 18.5 | 17.7 | 17.2 | 18.1 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 14.8 | 14.7 |

Note: SOSIC results are calculated from rebased population estimates and exclude missing values.

Sources: 2001 - Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, Wave 1, February-June 2001
 1999/2000 - Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, Annual Results
 1994/95, 1996/97, 1998/99 - National Population Health Survey (public use files, hence numbers may differ slightly from published Highlight reports; except for 1998/99 Health share file)
 1994/95 - Survey on Smoking in Canada
 1985/91 - General Social Surveys
 1990 - Canada's Health Promotion Survey
 1989 - National Alcohol and Other Drugs Survey
 1981/83/86 - Smoking Behaviour of Canadians (supplements to the Labour Force Surveys): non-proxy